

9

AMP en contexte viral

Pour l'année 2006, plus de 1 000 tentatives d'AMP ont été réalisées pour des couples dont l'homme ou la femme est infecté par le VIH. Au total, 125 enfants sont nés après AMP dans ce contexte.

Les AMP sont souvent proposées après échecs répétés d'auto-inséminations, témoignant d'une moindre fertilité chez ces femmes.

L'AMP est aussi proposée à des couples dont l'un des membres est infecté par le virus de l'hépatite C ou de

l'hépatite B, non plus pour éviter la contamination du conjoint mais pour pallier l'infertilité du couple. La prise en charge de ces couples suit des procédures spécifiques.

Du fait d'un nombre élevé d'incohérences dans les données déclarées, probablement lié à la complexité du questionnaire, l'activité et les résultats sont décrits de façon succincte dans les tableaux AMP 54 et 55.

Tableau AMP 54. Prise en charge des patients VIH+ ou co infection VIH

	Insémination intra-utérine		FIV+ICSI		TEC	
	H	F ou F+H	H	F ou F+H	H	F ou F+H
Tentatives *	507	81	206	113	59	39
Issues inconnues	80	0	51	0	19	0
% Issues inconnues	15,8 %	0,0 %	24,8 %	0,0 %	32,2 %	0,0 %
Accouchements	53	7	31	19	2	2
Uniques	46	7	25	19	1	2
Gémellaires	7	0	4	0	0	0
Triples ou plus	0	0	1	0	0	0
Issues de grossesses inconnues (%)	7 (9,6 %)	2 (20,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Enfants nés vivants	60	7	37	18	2	1

* Inséminations, ponctions ou décongélations.

Tableau AMP 55. Prise en charge des patients VHC+ avec RNA viral+ ou avec des antigènes HBs+ avec ou sans détection de DNA viral

	Insémination intra-utérine		FIV+ICSI		TEC	
	H	F ou F+H	H	F ou F+H	H	F ou F+H
Tentatives VHC	38	15	181	81	43	8
Tentatives VHB	59	28	224	123	39	13
% Issues inconnues	16,0 %	0,0 %	4,7 %	1,0 %	45,9 %	5,3 %
Nombre d'enfants nés vivants	5	1	73	34	5	1
Tentatives VHC	2	0	32	6	4	0
Tentatives VHB	3	1	40	29	1	1