

Rapport médical et scientifique régional - Activité 2016

Région - Alsace

| | Région [IC à 95%] | France |
|---|----------------------|------------|
| Prélèvement de donneurs décédés en EME | | |
| Nb de donneurs prélevés d'au moins un organe / pmh | 20,5 [14,0; 26,9] | 26,5 |
| Nb de donneurs recensés / 1000 décès hospitaliers | 11,1 [8,8; 13,3] | 12,5 |
| Nb de donneurs prélevés dont au moins un organe a été greffé / 1000 décès hospitaliers | 4,6 [3,1; 6,1] | 5,8 |
| % d'opposition au prélèvement d'organes des donneurs recensés sans autre cause de non prélèvement | 41% [29%; 53%] | 41% |
| Rein | | |
| Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh | 165,9 [147,6;184,2] | 187,4 |
| % de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier | 34% [30%; 38%] | 42% |
| Nb de nouveaux inscrits / pmh | 70,9 [58,9; 82,8] | 77,6 |
| Nb de patients greffés / pmh | 53,0 [42,7; 63,4] | 54,1 |
| Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois | 22 [18-25] | 25 [24-25] |
| Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois | 2 [1-3] | 2 [2-3] |
| % de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)* | 21% [12%; 29%] | 16% |
| % de greffes avec greffons placés sous machine à perfusion* | 73% [60%; 85%] | 67% |
| % de greffes avec ischémie froide > 18h hors DV, DDAC, greffe combinée* | 44% [34%; 54%] | 34% |
| % inscrits / patients dialysés < 70 ans en IRCT au 1 ^{er} janvier | 34% [16%; 52%] | 40% |
| Foie | | |
| Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh | 17,8 [11,8; 23,8] | 18,9 |
| % de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier | 35% [24%; 47%] | 50% |
| Nb de nouveaux inscrits / pmh | 22,0 [15,4; 28,7] | 27,3 |
| Nb de patients greffés / pmh | 18,9 [12,7; 25,1] | 19,8 |
| Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois | 68 [61-74] | 59 [58-60] |
| Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois | 10 [6-14] | 14 [13-15] |
| % de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)* | 0% [NC;NC] | 1% |
| % de greffes avec ischémie froide > 9h hors DV* | 14% [6%; 22%] | 21% |
| Coeur | | |
| Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh | 3,1 [0,6; 5,7] | 5,7 |
| % de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier | 33% [NC;NC] | 30% |
| Nb de nouveaux inscrits / pmh | 5,8 [2,4; 9,2] | 8,6 |
| Nb de patients greffés / pmh | 3,1 [0,6; 5,7] | 7,1 |
| Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois | 74 [64-82] | 68 [67-70] |
| Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois | 15 [9-22] | 13 [12-14] |
| % de greffes avec ischémie froide > 4h hors DV, DDAC, greffe combinée* | 0% [NC;NC] | 20% |
| Poumon | | |
| Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh | 2,6 [0,3; 4,9] | 2,4 |
| % de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier | 0% [NC;NC] | 6% |
| Nb de nouveaux inscrits / pmh | 9,4 [5,1; 13,8] | 5,4 |
| Nb de patients greffés / pmh | 11,0 [6,3; 15,7] | 5,6 |
| Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois | 85 [76-91] | 83 [81-84] |
| Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois | 7 [3-14] | 6 [5-7] |

EME : état de mort encéphalique.

*pour les indicateurs dont l'analyse est faite sur la région d'inscription des malades pour les autres il s'agit de la région de résidence.

CIT : contre-indication temporaire.

NC : non calculable car les effectifs sont trop faibles. Dans ce cas, la comparaison avec l'indicateur au niveau France est impossible.

NA : non applicable car pas d'équipe autorisée à la greffe dans la région ou pas d'activité de greffe en 2016.

Incidence cumulée : Les critères d'inclusion selon les organes sont détaillés dans la méthode.